

BASAMID® GRANULAT

Geodisinfestante ad ampio spettro

Composizione	Dazomet 99%
Formulazione	Granulare
Indicazioni di pericolo	Xn (nocivo) - N (pericoloso per l'ambiente)
Reg. Ministero Salute	1573 del 30/04/1974
Confezione	20 kg 
Pallet	840 kg 

® Marchio registrato e Prodotto originale Kanesho Soil Treatment



CARATTERISTICHE

Basamid è un geodisinfestante in formulazione microgranulare, attivo nei confronti di diversi funghi (in particolare *Fusarium spp.*, *Verticillium spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Phoma spp.*, *Rhizoctonia spp.*, *Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*), malerbe da seme (incluso orobanche) e da rizoma, insetti, forme libere di nematodi, batteri. Può essere impiegato in pieno campo e serra incorporandolo al terreno in assenza di coltura: a contatto con l'umidità del terreno si trasforma in 3 differenti composti gassosi, tossici per i vari organismi patogeni. L'impiego di Basamid permette un minore impiego successivo di agrofarmaci ed un migliore utilizzo dei fertilizzanti. Inoltre, ha un dosaggio flessibile in funzione delle avversità da controllare e non lascia residui nell'ambiente e nelle derrate agricole.



Avvertenze

Intervenire su terreno finemente lavorato e livellato e con l'umidità al 50-70% della capacità idrica di campo. Dopo l'applicazione, coprire il terreno con un film plastico o effettuare una o più irrigazioni, in modo da limitare la dispersione dei gas. Arieggiare il terreno con lavorazioni leggere 20-25 giorni dopo il trattamento. Si consiglia di eseguire il "test del crescita" prima di semina o trapianto della coltura. Non intervenire con temperature del terreno inferiori a 7° C. L'impiego di Basamid Granulat va limitato ad una volta ogni tre anni.

Intervallo tra applicazione e semina/trapianto

Da 20 a 25 giorni in funzione della temperatura del terreno.

COLTURA	AVVERSITA'	DOSE	NOTE
Colture ortive, floricole ed ornamentali in pieno campo ed in serra, fruttiferi (reimpianto)	Funghi del terreno, malerbe, insetti terricoli, nematodi	400-700 kg/ha	Applicare le dosi in funzione dell'infestazione prevista, ad una profondità di interramento di 20 cm. Aumentare di 150-200 kg/ha per ogni 10 cm di maggiore profondità.
	Malerbe	200 kg/ha	Incorporare il prodotto a 5-8 cm. Le lavorazioni successive non dovranno superare tale profondità. L'azione si esplica sui semi in germinazione o sugli organi di propagazione (stoloni, rizomi) presenti negli strati trattati.
Terricciati	Funghi del terreno, malerbe, insetti terricoli, nematodi	200-250 g/m ³	Mescolare uniformemente il prodotto con il terriccato e coprire il cumulo con un film plastico.