

Zn

Lebosol®-Zinco⁷⁰⁰ SC

CONCIME CE

Sospensione di concime a base di zinco (ossido)

Zinco (Zn) total 40 % (700 g/l Zn)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Ossido di zinco

Costituenti: 40 % Zn (700 g/l)

Densità: 1,75 kg/l

Valore pH: 8 - 9

Confezioni: 5 l

La sostanza attiva di prodotto ed il suo effetto:

Lo zinco spesso non è disponibile in suoli umidi, con valore elevato pH, con alto tenore di fosforo, e nei terreni freddi dove c'è molta umidità.

Sintomi di carenza di zinco sono striature clorotiche, colore arancione, crescita compressa e foglie piccole.

Coltura	Scopo	Raccomandazione
In tutte le colture	apporto di zinco	1 - 2 l/ha con concimazione fogliare in almeno 200 l d'acqua
Pomacee	germogliamento, sviluppo iniziale, qualità della rosetta,	3 - 4 volte 0, 25 l/ha a partire dallo stadio bottone rosso fino alla cascola di giugno
Drupacee	qualità della rosetta, apporto di zinco	2 - 3 x 0,25 l/ha dopo la fioritura
Fragole	stadio bottone florale, resistenza al freddo, qualità del fiore	1 l/ha in autunno (durante il nuovo trapianto)
	qualità dei fiori, fruttificazione, contro bacche sformate	0,5 l/ha bottone verde - bianco
Pomacee, Drupacee, Fragole, Piccoli frutti, Uva da tavola	deposito delle sostanze di riserva, rigenerazione, resistenza al freddo, qualità del fiore	2 x 0,5 l/ha dopo il raccolto
Piccoli frutti	qualità dei fiori, fruttificazione	0,5 l/ha prima della fioritura
Uva da vino, Uva da tavola	qualità dei fiori, fruttificazione, maturazione regolare	1 x 1 l/ha a partire dall'incremento dei grappoli fiorali fino all'inizio della fioritura
Ortaggi frutta, Crocifere, ortaggi a foglie e piante bulbose, Asparago, radici ortensi e piante tuberose	qualità della foglia, sviluppo iniziale, apporto di zinco	0,5 - 1 l/ha appena che ha sviluppato una superficie fogliare sufficiente
Cereali	contenuto di proteine, qualità dei grani, apporto di zinco	0,5 - 1 l/ha dallo stadio 3 foglie fino allo stadio un internodo
Mais	numero dei grani, rendimento di grano, apporto di zinco	1 l/ha a partire dallo stadio 4 foglie
Luppolo	sviluppo del bottone e della gemma, qualità	3 applicazioni con una soluzione al 0,03 - 0,05 % fino alla fioritura