

Mn

Lebosol®-Manganese⁵⁰⁰ SC

CONCIME CE

Concime al manganese in sospensione (ossido)

Manganese (Mn) totale 27,9 % (500 g/l Mn)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Ossido di manganese

Costituenti:
 Densità: 1,79 kg/l
 Valore pH: 8

Confezioni: 5 l

La sostanza attiva di prodotto ed il suo effetto:

Manganese spesso non è disponibile in suoli umidi, sabbiosi, soffici, con un valore elevato pH e in terreni freddi dove c'è molta umidità.

Sintomi di carenza di manganese sono foglie gialle, punti neri sulle foglie, marmorizzazione verde sulle nervature principali, perdita di qualità, ad es. qualità scadente della pelle di patate.

Coltura	Scopo	Raccomandazione
In tutte le colture	apporto di manganese	0,5 - 2 l/ha con concimazione fogliare in almeno 200 l d'acqua diverse applicazioni con piccole dosi aumentano l'efficacia
Fragole, Piccoli frutti	qualità della foglia, apporto di manganese	1 l/ha a partire dall'inizio della fioritura fino al raccolto
Pomacee	qualità della foglia, apporto di manganese	diverse applicazioni con 0,5 l/ha a partire dalla fioritura (nelle varietà disposte alla rugginosità soltanto a partire dallo stadio frutticini in accrescimento a grandezza di noce)
	colore di sfondo verde	3 x 0,5 l/ha dopo la cascola di giugno
Drupacee	qualità della foglia, apporto di manganese	2 - 3 applicazioni con 1 l/ha ogni volta a partire dalla fruttificazione fino al raccolto
Uva da vino, Uva da tavola	qualità della foglia, apporto di manganese	2 - 3 volte 1 l/ha appena che i grappoli fiorali sono visibili
Ortaggi frutta, Crocifere, ortaggi a foglie e piante bulbose, Asparago, radici ortensi e piante tuberose	qualità della foglia, colore delle foglie, resistenza, apporto di manganese	1 - 2 volte 1 l/ha appena che ha sviluppato una superficie fogliare sufficiente
Patate	riduzione della sensibilità alla ruggine	0,5 l/ha con la disinfezione
	qualità della pelle, resistenza, apporto di manganese	1 - 2 applicazioni con 1 l/ha a partire dall'inizio della chiusura delle interfile
Cereali	resistenza al freddo, apporto di manganese	0,5 - 1 l/ha in autunno a partire dallo stadio 3 foglie
	resa, resistenza all'allettamento, apporto di oligoelementi	0,5 - 1 l/ha in primavera a partire dall'inizio della vegetazione fino alla foglia a bandiera
Mais	resistenza, rendimento, apporto di manganese	0,5 - 1 l/ha a partire dallo stadio 4 foglie
Barbabietola da zucchero	resistenza, rendimento, apporto di manganese	1 - 2 volte 1 l/ha tra lo stadio 6 foglie e la chiusura delle interfile
Colza	resistenza al freddo, resistenza, rendimento, apporto di manganese	1 - 2 volte 1 l/ha in autunno a partire dallo stadio 4 - 6 foglie